



INSTRUÇÕES DE USO



Yumizen G IMIDAZOL

IMIDAZOL SOLUÇÃO TAMPÃO PARA TESTES DE COAGULAÇÃO

Nº cat.: 1300036385

12 x 15 mL

NOME DO PRODUTO

Yumizen G IMIDAZOL

USO PREVISTO

(Usar somente para diagnóstico in vitro)

Yumizen G IMIDAZOL destina-se à diluição de amostras e controles para ensaios de fibrinogênio (FIB).

PRINCÍPIOS ATIVOS

Yumizen G IMIDAZOL é uma solução tampão com estabilizador.

PRECAUÇÕES

- A solução contém azida de sódio. Esta pode produzir azidas metálicas, que podem ser potencialmente explosivas em encanamentos metálicos. Cumpra as devidas precauções!
- Espécimes, amostras e todos os materiais que entrarem em contato com elas devem ser manuseados como se fossem capazes de transmitir infecção e eliminados com as devidas precauções.
- Não use o reagente depois da data de validade impressa no rótulo.
- Evite a contaminação microbiana do reagente. Caso contrário, os resultados podem ser errados.
- Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B
- Palavra-sinal: Perigo
- H360: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (efeito específico do estado, se conhecido) (indicar a via de exposição, caso seja provado de forma conclusiva que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição).
- P201: Adquira instruções especiais antes do uso.
- P202: Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e entendidas.
- P280: Use luvas protetoras/roupas protetoras/proteção para os olhos/proteção para o rosto.
- P308+P313: Em caso de exposição ou suspeita de exposição: Procure aconselhamento/assistência médica.
- P405: Armazene fechado.

- P501: Elimine os conteúdos e embalagem de acordo com todos os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais.

PREPARAÇÃO

- Yumizen G IMIDAZOL solução é fornecido pronto para uso.
- Todos os reagentes, resíduos e equipamentos de laboratório descartáveis utilizados devem ser considerados resíduos nocivos. Seu manuseio e eliminação devem ser feitos de acordo com o regulamento válido de processamento de materiais de risco.

INSTRUÇÕES DE USO

Siga as instruções descritas na bula do Yumizen G FIB 2; nº cat.: 1300036383.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Yumizen G IMIDAZOL solução em frasco intacto é estável até sua data de validade apresentada no frasco, quando armazenado a 2-8°C. A estabilidade depois de aberto no frasco original é mostrada na tabela abaixo:

T (°C)	20-25	2-8
Semana	2	8

LIMITAÇÕES

A pessoa a instalar o reagente deve ser um profissional treinado de laboratório.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Yumizen G IMIDAZOL é recomendado para o seguinte teste de rastreio de hemostasia:

- Fibrinogênio (Yumizen G FIB 2; nº cat.: 1300036383)

FABRICANTE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE